

Syndrome de l'iris flasque

Catherine BOUREAU
PARIS

Iris flasque

IFIS : intra opetative floppy iris syndrome

- Décrit par CHANG en 2005
- Association :
 - Ondulation irienne
 - Myosis progressif
 - Prolapsus de l'iris per opératoire
- 3 grades :
 - 1 – iris flasque
 - 2 – iris flasque + myosis progressif
 - 3 – iris flasque + myosis + prolapsus irien

Fréquence de l' IFIS

- Fréquence : 2 à 4 % des cataractes
- **TAMSULOSINE** (Josir, omix,)
 - Alpha bloquants sélectifs sur les récepteurs alpha-1 A
 - Muscle de la prostate
 - Muscle irien
 - **57%** des patients sous tamsulosine
 - 2% des alpha bloquants moins sélectifs
- HTA, diabétique : plus rarement

- 
- Apparition rapidement au bout de quelques semaines de traitement
 - Mais persiste plusieurs années après l'arrêt du traitement
 - Complications dans 7 à 22 % des formes sévères

Précautions pré opératoires


- Chirurgien informé : interrogatoire ++
- Arrêt du traitement INUTILE
- ATROPINE 1 % matin et soir 48H avant

GRADE 3 : prolapsus irien

- Épinéphrine dilué intra camérulaire
- PVE de haute viscosité pour bloquer l'iris
- Maintenir l'irrigation à distance de l'iris
- Eviter le stretching de la pupille
- Bon contrôle des fluides en diminuant les constantes
- Petites incisions bien étanches

Utilisation des crochets iriens
Anneau d'expansion irienne

--



- 
- INFORMATION ++
 - Opérer rapidement car l'état de l'iris s'aggrave sous l'effet de l'irrigation